


Weiterführende Informationen finden Sie im Impfplan Österreich (siehe www.sozialministerium.gv.at/impfplan).



Legende

Empfohlen
kostenfrei

Nachholen empfohlen
kostenfrei

Empfohlen
nicht kostenfrei

Nachholen empfohlen
nicht kostenfrei

1 1. Dosis

2 2. Dosis

3 3. Dosis

B Boosterimpfung

D Einzeldosis

Hinweis:

Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Kapitel der jeweiligen Impfung bzw. entsprechende Fachinformation.

Prinzipiell sollten versäumte, empfohlene Impfungen ehestmöglich nachgeholt werden.

a Passive Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen während ihrer ersten RSV-Saison; Kinder geboren ab 1. Oktober bis 31. März (RSV-Saison) innerhalb der ersten Lebenswoche, nach der Geburt vor Entlassung aus dem Krankenhaus; Kinder geboren ab 1. April bis 30. September vor deren erster RSV-Saison; Details unter www.impfen.gv.at/rsv

b Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen, kostenfrei) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (RotaTeq, 3 Dosen)

c Bis zur Vollendung der Schulpflicht

d Nach Grundimmunisierung mit 6-fach Impfstoff mindestens zwei Auffrischungsimpfungen mit 4-fach Impfstoff, danach weitere Impfungen alle 5 Jahre mit 3-fach Impfstoff (dTaP); weitere Impfungen mit zusätzlich Polio-Komponente nur bei spezieller Indikation

e Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen

f 21. bis 30. Geburtstag: 2 Dosen im Abstand von 6–12 Monaten. 1. Impfung bis 31.12.2025 kostenfrei, 2. Impfung bis 30.6.2026 kostenfrei. Details unter www.impfen.gv.at/hpv

g 3-Dosen-Schema ab dem 30. Geburtstag

h Anmeldung zur gratis Impfung im öffentlichen Impfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung ab November 2025 möglich. Siehe auch impfen.gv.at

Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler.